

جنسی امراض

کا

ہومیوپیتھک علاج



ہومیوپیتھک ڈاکٹر فتح شیر

جلد حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتب	_____	جنسی امراض کا ہومیو پیتھک علاج
مصنف	_____	ہومیو پیتھک ڈاکٹر فتح شیر
تاریخ اشاعت	_____	۱۹۹۰
تعداد	_____	۳ ہزار
قیمت	_____	۲۵ روپے
طبع	_____	پریس بورڈ پرنٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ راولپنڈی

ناشر۔ الفتح ہومیو پیتھک دواخانہ، علیہ مجید روڈ راولپنڈی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارف

موجودہ دور میں انسانی صحت کے لئے مختلف قسم کی ادویات اور آلات ایجاد ہو چکے ہیں۔ لیکن اُس کے جنسی مسائل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر افراد جنسی کمزوریوں اور عیاشیوں میں پڑ کر اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں۔ سنیمیا اور ٹیلی وژن کے علاوہ اشتہاری حکیم اور بیشتر دواساز کمپنیاں جنسی مسائل کو مشہور کرنے اور انہیں ہر جگہ بنانے میں مصروف ہیں۔ اس طرح ان اداروں نے ایک نئی جگہ کو ایک تہلکی مسئلہ بنا لیا ہے۔

جنسی خرابیاں دور کرنے کے لئے جو میوہ پھل تک طریقہ علاج میں نہایت اعلیٰ ادویات موجود ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب مریض میں بیماری سے نجات حاصل کرنے کا صحیح جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ اُن تمام برے افعال سے باز آجائے جن کا وہ مرتکب رہا ہو۔ اگر مریض خود اپنے رویے میں فیصلہ کن تبدیلی پیدا کرنے کا اہل نہیں تو پھر اُسے کسی بھی طریقہ علاج سے فائدہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔

جنسی خرابیوں یا بیماریوں کے لئے جو میوہ پھل تک اور بلاوہ کیمک ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ اُن کی اہم علامات اس کتاب میں درج کر دی گئی ہیں۔ عمدہ نتائج حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کتاب کا بغور مطالعہ کیا جائے اور مریض کے لئے صرف ایک دوا منتخب کی جائے ایک سے زیادہ ادویات دینا یا ان کو ملا کر دینا، بادی بادی دینا یا ادویات کو جلد جلد سمیٹ کر دینے سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو گا۔

ادویات کا استعمال 30 پونسی سے شروع کرنا مناسب ہے۔ پھر حسب ضرورت دوا کی
پونسی کو 200 یا 1000 یا ایک لاکھ تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ بعض صورتوں میں ہر ٹیکہ
3 یا 6 یا 12 طاقت تک گھٹایا جاسکتا ہے۔ بلاو کیمک ادویات کا استعمال 6x سے شروع کرنا
موزوں ہے۔ پھر ضرورت کے مطابق 12x یا 30x یا 1000x تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ دوا کی
چلہ خوراکیں روزانہ کافی ہیں۔ لیکن 200 یا 1000 طاقت کی ایک خوراک ہفتے میں ایک ہی دفعہ
دہنی چلیے۔ ایک لاکھ طاقت کی ایک خوراک ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کے لئے کافی ہوتی
ہے۔

فتح شیر

الفتح ہو میوہر ہتھک دواخانہ

علبہ مجید روڈ۔ راولپنڈی

فہرست

حصہ اول (مردانہ)

صفحہ

1
6
10
11
13
14
15
18
26
30
31
34

مضمون

احكام
ايستادگی
بغل گیری
انزال
جریان
مادہ منویہ
جلق
جماع
نامردی
عضو مخصوص
بہ اثرات
ذہنی علامات

حصہ اول

(مردانہ)

احتلام

1- احتلام کی پُرانی شکایت جس کی وجہ سے مریض بہت تمکلات اور کمزوری محسوس کرے۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جائے اور اپنی پسندیدہ چیزوں سے بھی اُسے لگاؤ نہ رہے۔ مریض اپنی صحت کے متعلق بروقت فکر مند رہتا ہو۔

ٹاسفورک لیسٹ

2- ایسے مریض میں احتلام کی شکایت جو اکثر سرد اور ہاضمہ کی خرابی میں مبتلا رہتا ہو۔ رہنے سہنے، کھانے پینے میں عیاش ہو۔ مسالہ دار غذائیں استعمال کرے۔ کثرتِ مباشرت یا جلق لگانے کا عادی رہا ہو۔ احتلام زیادہ تر صبح کے وقت ہوتا ہو۔

نکس و امینکا

3- بکثرت احتلام کی وجہ سے مریض بہت کمزور ہو جائے۔ مریض غلیظ جو جلد کی تکالیف میں مبتلا رہتا ہو۔ ہاتھ، پاؤں اور سر کی چوٹی میں عموماً جلن کا احساس بھی پایا جاتا ہو۔

سلفر

4- موٹے پلپے افراد میں احتلام۔ احتلام کے بعد ہم جسم پر
خصوصاً ہاتھ پاؤں پر پسینہ آجائے۔ احتلام صبح 3 بجے سے
تھوڑا بعد ہو۔

کلکیریا کلاب

5- جنسی خواہشات دب جانے سے احتلام ہونے لگے۔
خصیوں میں درد رہتا ہو چکر آتے ہوں۔

کو نیم

6- کثرت مباشرت یا جلق کی وجہ سے اکثر احتلام ہو جاتا ہو۔
مریض کے ذہن پر بروقت جنسی خیالات چھائے رہتے
ہوں۔

سٹفی سائیگییریا

7- احتلام و جریان ایسے افراد میں جو برسوں جلق لگانے کے
عادی رہے ہوں۔ گہری نیند میں احتلام ہو جائے لیکن
مریض کو جاگ بھی نہ آئے۔ نبض سست ہو اور دل کی
تکلیف بھی ساتھ ہو تو یہ ترجمیمی دوا ہے۔

ڈبھی میلس

8- بکثرت احتلام کی وجہ سے شدید کمزوری، غشی اور اندھلپن
ہو جائے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو۔ کانوں
میں گھنٹیاں سی بجتی ہوں۔ پیٹ ہوا سے پھولا رہے۔

چائتا

بغیر ایستادگی کے احتلام

1- احتلام عموماً جلق لگانے کا نتیجہ ہو۔ عضو ٹھنڈا، ڈھیلا، لٹکا
ہوا۔ مریض ذہنی لحاظ سے صحت مند لیکن جسمانی طور پر
کمزور ہو۔

لائیکوپو ڈیم

- 2- احلام جلق نکلنے کی وجہ سے ہو۔ مریض کے ذہن میں ہر
وقت جنسی خیالات کی کثرت رہے۔
شغلی سائیکیریا
- 3- احلام کے بعد گھنٹوں میں کمزوری آجائے۔
ڈائسکوریا
- 4- احلام کے بعد کمزور ہونے لگے۔
کوپاٹم
- 5- احلام کے بعد ناکلیں ٹھنڈی ہو جائیں۔
گرفاٹس

خون آنا

- 1- احلام میں خون آنے یا خون آمیز مواد خارج ہو۔
رک سبل۔ کینٹھرس
- ## وقت اور وقفہ
- لیڈم پال۔ سلو پریلا
 - پیزولیم۔ لیکیسن۔

- 1- احلام اکثر صبح کے وقت ہوتا ہو۔
ٹکس وایکا
- 2- احلام صبح تین بجے سے تھوڑا بعد ہوتا ہو۔
ٹککیریا کارب
- 3- تقریباً ہر رات ہو جاتا ہو۔
یٹرم فاس
- 4- جلق کے نتیجے میں احلام تقریباً ہر رات ہو۔ ایستادگی نہ
ہو۔ عضو ساسل مر محمایا ہوا۔
ار جنٹم میٹ
- 5- ہر دوسری رات ہو جائے۔
پکیرک ایسڈ
- 6- ہر تیسری یا چوتھی رات ہو جائے۔
ٹکس وایکا
- 7- احلام بکثرت ہوتا ہو۔ رات کو دو دو تین تین بار ہو
جائے۔ بعد میں گھنٹوں میں شدید کمزوری محسوس ہو۔
ڈائسکوریا

جنسی خواب اور احتلام

1- جنسی خواب دیکھنے سے صبح کے وقت احتلام جو ہر تیسری یا چوتھی رات کو ہو جایا کرے۔

ٹکس و امیکا

2- جنسی خواب دیکھنے سے اکثر احتلام ہو جاتا ہو۔ صبح نیم خوابی کی حالت میں ایسا دیکھتا ہو۔ لیکن جاگ اٹھنے پر ایسا دیکھتا ہو۔ جس بات کے متعلق سوچتا سوچتا سو جائے۔ اسی کے خواب ساری رات نظر آئیں۔

کیلیڈیم

3- جنسی خواب دیکھنے سے کثرت احتلام جو نامردی کا باعث بنے۔ جنسی خیالات مریض کے ذہن پر سوار رہیں۔

فاسفورس

4- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام۔ مریض کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔ مریض اپنی صحت کی خرابی کے متعلق بہت فکر مند ہو (فاسفورک ایسڈ)

سٹریکٹین

5- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام ہو جانے کی چند دیگر ادویات

سیلفیم۔ سارپریٹا

ڈائسکوریٹا

بغیر خواب کے احتلام

1- بغیر خواب کے احتلام ہو جائے۔

ارجنٹم ٹائٹ

پیکرک ایسڈ۔ جیلیم

ڈیٹیل

بایو کیمک ادویات

- 1- احتلام بغیر استادگی کے ہو جائے۔ مادہ منویہ درد کے ساتھ خارج ہو۔ اعصابی کمزوری بھی ہو۔
کلی فاس
- 2- خواب کے بغیر احتلام ہو۔ مادہ منویہ پانی کی طرح پستلا ہو
معدے میں تیز اترت، پیمٹ میں کیزے ہوں۔
نیشرم فاس
- 3- ذہن بروقت جنسی خیالات میں مبتلا رہے۔ اسی وجہ سے احتلام ہو جاتا ہو۔
سلیشیا
- 4- احتلام کے بعد سردی اور سستی محسوس کرے اور شہوت کا زور ہو جائے۔
نیشرم میور
- 5- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام ہو جائے۔ مریض پست بمت، گلگین چڑچڑا اور شرمیلا ہو۔
کلی فاس

ایستادگی

ایستادگی کی شدت

- 1- شدید ایستادگی خصوصاً رات کے وقت جس کی وجہ سے عضو میں درد ہو۔ مریض تمام رات بے چینی سے گزارے۔
پکڑک ایسٹ
- 2- خواہش کی زیادتی جس کی وجہ سے نہایت تیز اور مسلسل ایستادگی رہے۔ رات کی شدید ایستادگی سے نیند میں خلل آجائے (پکڑک ایسٹ)
کینتھرس
- 3- خواہش کی زیادتی کی وجہ سے تکلیف دہ ایستادگی جس کے بعد پیشاب کی نالی میں سوئیاں نچھنے کا احساس ہو۔
کنائس شلہ نوا
- 4- بار بار ایستادگی جس پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ حد سے بڑھی ہوئی جلت کی خواہش۔ مریض کو جماع کا جنون ہو۔
فاسفورس
- 5- شدید ایستادگی جس سے پیٹ میں درد ہونے لگے۔ مادہ منویہ مشکل سے خارج ہو یا اس کا اخراج نامکمل ہو۔
زنکم میٹ
- 6- شدید ایستادگی کی چند دیگر ادویات۔
پلامینا - پلسا میلا۔
نکس و امیکا
فلورک ایسٹ

ایستادگی کے اوقات اور مواقع وغیرہ

- 1- جمع کا خیال آتے ہی فوراً ایستادگی ہو جائے۔
فاسفورس۔
زنگم میٹ
برٹاکلڈ
ہونیا کلاب۔
اگنس کاشن
- 2- ایستادگی در سے ہو۔
- 3- ایستادگی صبح کے وقت ہو۔
- 4- صبح نیم خوابی کی حالت میں ایستادگی ہو جو جانے پر ختم ہو جائے۔
کیلیڈیم
- 5- صبح کے وقت جمع کی خوابش کے بغیر ایستادگی ہو۔ عضو
سُن اور اُس کے سر سے پر شہوانی خلش ہو۔
اسبراگریا
- 6- نیند کی حالت میں ایستادگی ہو لیکن جانے پر ختم ہو جائے۔
اوہیم
- 7- ایستادگی صرف رات کے وقت ہو۔
پکرک ایسڈ
کینتھرس۔ پلاٹینا
- 8- ایستادگی کھاتا رہے۔
فاسفورس۔ آرم میٹ
فلورک ایسڈ۔
ناترک ایسڈ۔
- 9- بوڑھے آدمیوں میں بکثرت ایستادگی۔
کینتھرس
کاشیکم
- 10- لیٹ جانے پر ایستادگی ہو جائے۔
اگزالف ایسڈ

- 11- کمانے سے ایستادگی ہو جائے۔ کینٹھرس
12- پیشاب کرنے کے بعد ایستادگی ہو جائے۔ نیشرم کلاب
13- گاڑی میں سوار ہونے سے ایستادگی ہو جائے۔ کلکیریا فاس
14- گھوڑے پر سواری کرنے سے ایستادگی ہو جائے۔ کنلاس انڈیکا
15- انزال کے بعد ایستادگی ہو جائے۔ فاسفورک ایسٹ

نامکمل ایستادگی

- 1- بوس وکنار اور دوسرے جنسی ہیجانات سے بھی ایستادگی نہ ہو۔ کیلیڈیم۔ نیوفر لٹیم
2- جماع میں ایستادگی کے بغیر ہی انزال ہو جائے۔ کیلیڈیم۔ سیلیم
3- ایستادگی برائے نام ہو۔ انزال کے بعد کمزوری اور چڑچڑاہٹ آجائے۔ سیلیم
4- ایستادگی موجود ہو لیکن جماع کی کوشش پر عضو ڈھیلا پڑ جائے۔ کیلیڈیم۔ سیلیم
5- جماع کے دوران ایستادگی نامکمل ہو۔ اگنس کاسٹس۔ ار جنٹم میٹ۔ فاسفورک ایسٹ۔ اگنس کاسٹس۔ گریفائٹس۔ سلفر۔ کوہنیم۔ ملانیکوپوڈیم۔ سیپیا

کیلیڈیم۔ کوئٹہ۔
لائیکوہیڈیم۔
گرفائٹس

6۔ بغیر ایستادگی کے جملع کی خواہش ہو۔

بایو کیمک ادویات

1۔ ایستادگی کے وقت عضو میں کمی اور درد ہو۔ درد کی وجہ
— عموماً سوزاک ہو۔

نیٹرم فاس۔
میگنیشیا فاس۔
کالی فاس
کلکیریا فاس۔

2۔ ایستادگی تکلیف دہ ہو۔

نیٹرم سلف
فیرم فاس۔ سلیشیا

3۔ رات کے وقت تکلیف دہ ایستادگی ہو۔

4۔ گاڑی میں سوار ہوتے وقت ایستادگی ہو جائے۔ جس میں

کلکیریا فاس

جملع کی خواہش نہ ہو۔

بغل گیری

- 1- استادگی موجود ہو لیکن بغل گیر ہوتے ہی ختم ہو جائے۔ نکس و امیکا
- 2- استادگی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے۔ کونیم
- 3- بغل گیر ہوتے ہی انزال ہو جائے۔ زنگم میت
- 4- جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ استادگی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے۔ کیلیڈیم۔ سیلفنیم۔ لائیکو پوڈیم۔ کونیم۔ کلکیریا کارب۔ سیلفنیم
- 5- بغل گیر ہونے پر بھی استادگی نہ ہو۔ لائیکو پوڈیم
- 6- بغل گیری ہی میں ہو جائے۔ میوریکس
- 7- بغل گیر ہونے کی بڑھی ہوئی خواہش ہو۔ پلامینا۔ اگریکس
- 8- ساتھ کھڑے لوگوں سے بغل گیر ہونے کی خواہش۔

انزال

- 1- انزال کے بعد تکلیف ہو جائے۔
نکس وامیکا۔
- 2- جماع میں بغیر استادگی کے انزال ہو جائے۔
کلی کارب
کیلیڈیم۔
جیلسمیم
- 3- مکمل استادگی سے پہلے ہی انزال ہو جائے۔ انزال درد کے ساتھ ہو۔
سلفر
- 4- انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔
نکس وامیکا۔
سٹفی سائیکریا
- 5- انزال بہت دیر سے ہو۔
فاسفورک ایسٹ
کلکیریا کارب
- 6- انزال دیر سے ہو۔ اور بعض اوقات جو بی نہیں۔
گریفٹائٹس۔
لانی سین
- 7- انزال میں ایسے محسوس ہو۔ جیسے مادہ منویہ چھیل دینے والا ہے۔
کونیم

سرعتِ انزال (دیکھئے بغل گیری بھی)

- 1- مکمل استادگی سے پہلے یا اس کے فوراً ہی بعد انزال ہو جائے۔
سلفر
فاسفورک ایسٹ

2- دخول سے پہلے ہی انزال ہو جائے۔ منی کا اخراج درد کے ساتھ ہو۔

سلفر

3- جماع کی خواہش بڑھی ہوئی ہو۔ لیکن عضو کمزور ہو۔ جلد انزال ہو جائے۔

نیشترم میور

گریفائٹس۔

زنگم میٹ

4- جماع کے دوران جلد ہی انزال ہو جائے۔

5- سرعتِ انزال۔ ایستادگی برائے نام۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ ہو۔

سیلنیم

6- سرعتِ انزال۔ جماع کے بعد درد اور کمزوری ہو جائے۔

سٹیفنی سائیکیریا

7- سرعتِ انزال، جریان، نامردی جو جلق لگانے کی وجہ سے ہو جائیں۔

یونفو

عورت کی موجودگی

1- عورت کی قربت سے، اُسے دیکھنے سے یا اُس کا خیال آنے سے ہی انزال ہو جائے۔

کوئیم۔ سیلنیم

پیکرک ایسٹ۔

میوریکس

2- عورت کو چھونے سے ہی انزال ہو جائے۔

3- عورت کی قربت سے، جماع کا خیال آنے سے یا بوس و کنار سے انزال ہو جائے۔

کوئیم

بایو کیمک ادویات

کلیریفاس۔

کالی فاس۔ نیشترم میور

1- سرعتِ انزال

جریان

- 1- اُنٹے بٹختے، چلتے پھرتے اور پاختہ کرتے وقت منی یا مذی کے قطرے خارج ہوتے رہیں۔
 - 2- بوس وکنڈ کے دوران مذی خارج ہونے لگے۔
 - 3- پاختہ پر زور لگانے سے مذی کے قطرے بہنے لگیں۔
 - 4- قبض کی وجہ سے پریشاب کے ساتھ منی یا مذی کے قطرے خارج ہوں۔
 - 5- مشت زنی یا کثرتِ مباشرت سے جریان منی ہو جائے۔
 - 6- منی یا مذی کے قطرے کرتے رہنے سے منظر کمزور ہو جائے۔
 - 7- جریان جب کہ دل کی غیر معمولی دھڑکن بھی ہو۔
- کونیم۔ اگنس کاشس
ایلو مینڈا۔ انا کلرڈیم۔
اگنس کاشس
نکس دامیکا۔ سلفر
فاسفورک ایسڈ۔
سٹفی سائیگییریا۔
فاسفورس۔ یونو۔
کلی کلرب
ڈی میلس۔
بریا کلرب

بایو کیمک ادویات

1- جریان منی یا مذی

- نیٹرم فاس۔
کلی فاس۔
نیٹرم میور سلیشیا۔
کلکیریا سف

مادہ منقویہ

- 1- پانی کی طرح پتلا ہو۔
 - 2- خونی ہو۔
 - 3- خون آمیز ہو۔
 - 4- جس کی تیز بو ہو۔
 - 5- بوگندے پریشاب کی مانند ہو۔
 - 6- گرم ہو۔
 - 7- ٹھنڈا ہو۔
- سیلنیم۔ سلفر۔
سیسہ۔ نیشترم فاس
لائیکوپوڈیم۔
فلورکب ایسڈ
مرک۔ سال۔ لیڈم۔
سارپریٹا۔ سٹابرس
لیکیس
نیشترم فاس
کلکیریا کارب۔
مرٹھولا کیوبنس۔
اگریکس
نیشترم میور

جَلَق

(مشت زنی، خود لذتی)

عادت، رحمان

1- جلق لگانے کا زبردست رحمان ہو

یوفو۔ پلائینا۔
اور۔ کائنم
سٹفی سائیکیریا
فاسفورک ایسڈ
لیکیس۔

2- مریض جلق لگانے کی وجہ سے اتھمائی پشیمان ہو۔ اور اپنی

صحت کی خرابی سے فکر مند رہتا ہو۔ جلق لگانے اور انظام

بازی کی عادت چھڑانے کے لئے مفید ہے۔ فاسفورک ایسڈ

3- مریض تھما جگہ کی تلاش میں رہتا ہو تاکہ مشت زنی کر

سکے۔ اسی وجہ سے سرعتِ انزال، جریان اور نامردی ہو

جانے۔

یوفو

4- بڑی بوٹی جنسی خواہش اسے پاگل سا بنا ڈالے

(فاسفورس) اور جلق لگانے کی طرف مائل کر دے۔ جلق

کھانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لئے قابل اعتماد ادویات میں (فاسفورک ایسڈ) اور بکائیو۔ اسٹیکو

5۔ ایسے مریض میں جلق کی عادت دُور کرے جسے صبح غنودگی کی حالت میں ایسٹاڈی بولیکن جاگ اٹھنے پر ایسٹاڈی ختم ہو جانے۔ عضوسرد، لٹکا ہنڈا اور پلپلا ہو۔

کیلیڈیم

6۔ جلع کی خواہش دب جانے سے اگر مریض جلق کھانے لگے تو اُس کی عادت کو روکے گی۔ اگر مریض کو چکر بھی آتے ہوں تو ترکیبی دوا ہے۔

کو نیم

7۔ بلوغت سے پہلے ہی جلق کھانے کا عادی ہو جانے۔ نیند کے دوران مشت زنی کرے۔ جلق کھانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو دُور کرتی ہیں۔

نکس و امیکا

پلائینا

جلق سے تکالیف (دیکھنے بد اثرات بھی)

- 1۔ جلق باز جو اعصابی تکالیف اور ذہنی و جسمانی کمزوری میں مبتلا ہو جائیں۔ مریض مرد ہو یا عورت۔ کللی فاس۔ جیلسمیم
- 2۔ نوجوان جو جلق کھانے یا کثرتِ مباشرت سے نامرد ہو جائیں لائیکو پوڈیم۔ کیلیڈیم
- 3۔ جلق کھانے سے شدید کمزوری یا دیوانگی ہو جائے۔ مریض کی آنکھوں کے نیچے سیاہی مائل نشان ہوں۔ مریض چڑچڑا ہو۔ اور اس میں شرمیلاہن پایا جائے۔ مشت زنی چھڑانے کے لئے بہت اچھی دوا ہے (اسٹیکو) سفیر۔ سائیکرا

4- جلق لگانے یا کثرتِ مباشرت سے عضوِ لوتھڑے کی مائتہ
ڈھیلا ہو جائے۔

کیلیڈیم
جیلٹیم

کنس

بایو کیمک ادویات

کلکیریا قاس

1- جلق لگانے کا رجحان ہو۔

2- جلق لگانے کی وجہ سے اعصابی کمزوری۔ مریض شرمیلا

کالی قاس

چڑھڑا اور کم ہمت ہو جائے۔

جماع

خواہش کی زیادتی

1- جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ ایسا تاگی بغل
گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے۔

کیلیڈیم۔ سیلنیم۔
کوئیم۔ نکس و امیکا
لائیکوپوڈیم۔

2- جنسی خیالات زیادہ ہوں لیکن طاقتِ جماع ختم ہو جانے۔
عام جسمانی اور ذہنی کمزوری۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ

سیلنیم

3- ایک ہی رات میں کئی بار جماع کرنا چاہے۔ لیکن جماع کے
بعد ذہنی اور جسمانی کمزوری ہو جائے۔ مریض اپنی صحت کی
خرابی سے فکر مند رہے۔

فاسفورک ایسڈ

4- جماع کی شدید خواہش ہو۔ دھیان ہر وقت جنسی معاملات
میں لگا رہے۔

سٹفی سائیکیریا

5- بوڑھے آدمیوں میں جماع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن
دراصل وہ نامرد ہوں۔

لائیکوپوڈیم۔ سیلنیم

6- جماع کی خواہش جنون کی حد تک بڑھ جائے۔ اپنے آپ کو
تکا کر دے جبکہ جماع کی طاقت کم ہو گئی ہو۔

فاسفورس

7- جملع کی شد یہ خواہش ہو۔ دخول کے ساتھ ہی انزال ہو
جانے۔ اس کے برعکس جملع سے بے رغبتی اور ایستادگی
کلبا نکل نہ ہونا بھی پایا جاتا ہے۔

گریفائٹس

8- کبھی جملع کی خواہش بہت زیادہ ہو اور کبھی اس کی رغبت
ہی نہ رہے

پلساٹیل

پلاٹینا

9- جملع کی شد یہ خواہش کے ساتھ بدن میں لرزہ آجانے۔

10- مرد یا عورت میں جملع کی خواہش بڑھ جانے خواہ بوڑھے
ہی ہوں۔

ماسکس

11- کسی دوسری تکلیف کے دب جانے سے جملع کی خواہش
بڑھ جانے۔

کونیم۔ پلساٹیل۔

کیفر۔ لانی سین

خواہش کی کمی

1- جملع کی رغبت ہی نہ رہے

گریفائٹس۔

نیوفریئم۔ سفر

2- جملع کی خواہش ہی نہ رہے اور نہ ہی جملع کرنے کی طاقت
ہو۔

آکس کاسٹس۔

کیلیئم۔ سیمنیم۔

اناسموڈیم

گریفائٹس۔ سیپیا

3- مرد یا عورت کو جملع سے نفرت ہو جانے۔

4- موٹے آدمی میں جملع کی خواہش نہ رہے

کالی بانی

5- جماع کی خواہش کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہے۔ جماع میں

لائیکوہوڈیم

لطف نہ آئے۔ عضو ٹھنڈا۔

سنگھی سائیکیریا۔

6- جماع کی خواہش کم ہو جانے کی چند دیگر ادویات۔

سلیشیا۔ برشا کلاب

جماع کے دوران

1- تکلیف بڑھ جائے۔

کینتھرس۔ سیلفیم

کریفائٹس۔

کالی کلاب

2- درد ہونے لگے۔

ارجنٹم نامت۔

کلکیریا کلاب

سیل سیرولینا۔

3- انزال نہ ہو

گرفائٹس۔

علی لوٹس۔

4- انزال سے درد ہونے لگے

سلفر۔ مرک سال

نیٹرم میور

5- انزال میں مادہ منویہ ٹھنڈا ہو۔

6- انزال میں مادہ گرم ہو جس سے پیشاب کی نالی میں جلن

اگریکس

ہونے لگے۔

7- لطف آنے کے کچھ وقت بعد ہی منی خارج ہو یا جماع میں
لطف نہ آئے عضو پر گہ گہی ہونے لگے جس کی وجہ سے

کلکیریا کلاب

علیحدہ ہونا پڑے۔

کیلیڈیم

8- عضو جمیلا پڑ جائے۔

یوفو

9- تشنج ہو جائے۔

لائیکوپوڈیم۔

10- پینہ آجائے

برشا کلاب

جماع کے بعد

اگر کس۔

1- تکالیف یہہ اہو جائیں

کلی کلاب

کلکیریا کلاب

سلیشیا۔ سیمیا

کلی کلاب۔

2- احتلام ہو جائے۔

برشا کلاب۔

نیرم میور

فاسفورک ایسٹ

3- انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔

سیمیا

4- بے چینی ہو جائے۔

کلکیریا کلاب۔

5- بے چینی، کالی اور کمزوری ہو جائے۔

سیلفنر

- 6- باتیں بھولنے لگے۔ فاسفورک ایسڈ۔
نیٹرم فاس
- 7- پسینہ آجائے۔ نیٹرم فاس۔
گریفائٹس
- 8- ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آجائے۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری
محسوس ہو کر اور سر میں درد ہو۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔
کلیکیریا کارب
- 9- پیشاب کی حاجت ہو جائے۔ حقیقی سائیکیریا
- 10- پیشاب کرنا مشکل ہو جائے۔ سیمل سیرولینا
- 11- پیشاب کی نالی میں درد ہونے لگے۔ کینتھرس
- 12- تشنج ہو جائے۔ بھوک لگ جانے۔ اگریکس
- 13- ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ گریفائٹس
- 14- کمزوری بہت ہو جائے۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کلیکیریا کارب
- 15- عضومیں جلن ہونے لگے۔ کریازوٹ
- 16- خصیے سکوڑنے لگیں۔ آئیوڈیم۔
- 17- کٹی قسم کی سکیلیف پیدا ہوں۔ خصوصاً چکر آنے لگیں۔ سیمل سیرولینا
- 18- دانت درد ہونے لگے۔ پیمپا۔ بووشا
- 19- جماع کی کوشش پر دمہ ہو جائے۔ ڈافن
- 20- رزھ کی ہڈی میں تکلیف محسوس ہونے لگے۔ امبراگرسیا
- 21- سوچ بچار کرنا مشکل ہو جائے۔ اگریکس۔ کالی فاس
- 22- غش کھاجانے۔ فاسفورک ایسڈ۔
اگریکس۔

23۔ نے یا علی ہونے لگے۔

24۔ کر دود ہونے لگے۔

25۔ شدید جسمانی کمزوری ہو جائے۔

ماسکس

کالی کلاب۔ کبا ٹم۔

کنڈس ایشہ کا

اگر بکس۔

کالی فاس۔ پاتلا۔

سیلنیم۔

فاسفورک ایسڈ۔

نکس و امیکا۔

کلکیریا کلاب۔

فاسفورس۔ نیٹرم میو

سٹفی سائیگیریا۔

انا کارڈیم۔

اگنس کاسٹس

فاسفورک ایسڈ

کلکیریا کلاب

سیلنیم۔ سلیشیا

سٹفی سائیگیریا۔

کلکیریا کلاب۔ سیسیا۔

نکس و امیکا۔ کوئیم

سٹفی سائیگیریا۔

26۔ شدید جسمانی اور دماغی کمزوری ہو جائے

27۔ گھٹنوں میں کمزوری آجائے۔

28۔ مریض چڑچڑا اور حساس ہو جائے۔

29۔ گلین ہو جائے۔

30۔ مریض اپنے گزشتہ برے افعال پر چمکتا ہے۔ صحت کی

خرابی سے بہت لگرمند ہو۔

فاسفورک ایسڈ۔

سٹفی سائیگیریا

45- نیٹرم فاس

45- آگریکس

مرک کار

کالی کارب

فاسفورس - سیپا

آگریکس

31- خوش مزاج ہو جائے۔

32- خوشی اور ہلکا پن کا احساس ہو۔

33- معائے مستقیم میں ٹیس اٹھے۔

34- نظر ہم ہو جائے۔

35- بے خوابی ہو جائے۔

بایو کیمک ادویات

1- جماع کی خواہش شدید ہو

کالی فاس۔

کلکیریا فاس

نیٹرم فاس

میگنیشیا فاس۔ سلیشیا

سلیشیا۔ کلکیریا فاس

کالی فاس۔

فیرم فاس

کالی سلف

2- بروقت جنسی خیالات ذہن پر مسلط رہیں۔

3- جماع کی خواہش ختم ہو جائے۔

4- جماع کی خواہش کم ہو جائے یا بالکل نہ رہے۔

5- جماع کے بعد کمزوری ہو جائے۔ نظر کمزور ہو جائے۔ درد

ہونے لگے۔

کالی فاس

سلیشیا

6- جماع کے دوران یا اس کے بعد متلی ہونے لگے۔

7۔ انزال کے بعد تکالیف میں زیادتی ہو جائے۔

سلیشیا۔

نیشم میور۔

نیشم فاس۔

مکھیر فاس۔

کالی فاس۔

کالی فاس۔

8۔ صبح کے وقت خواہش زیادہ ہو۔

نامردی

1- نامردی جو کثرتِ مباشرت، احتلام اور مشت زنی کی وجہ سے ہو مریض غصیل، محتاط اور جتنے جتنے کام کرنے والا ہو۔ کھانے پینے میں عیاشی برتے۔ سردی، کمر درد، قبض اور بواسیر میں مبتلا ہو۔ (یہ دوا خاطر خواہ فائدہ نہ دے تو سلفر دس)

نکس و امیکا

2- نامردی، مریض میں خواہش جماع ہی نہ رہے۔ اکثر احتلام ہوتا رہے سرعتِ انزال ہو۔ مریض شدید نقابت محسوس کرے۔ کمر درد اور باضمے کی خرابیوں میں مبتلا ہو۔ جسم کے مختلف اعضا میں جلن، خصوصاً ہاتھ، پاؤں اور سر کی چوٹی میں جلن اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔

سلفر

3- موٹے، پلپلے، مریضوں کی نامردی کی دوا ہے۔ جو سردی زیادہ محسوس کرتے ہوں۔ انزال کے بعد مریض کو پسینہ آجاتا ہو۔ خصوصاً ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آنے جماع کے بعد سر اور کمر میں درد ہونے لگے۔

کلکیریا کارب

4- کثرتِ مباشرت اور مشت زنی کی وجہ سے نامردی۔ خواہش جماع کم ہو جانے۔ عضو چھوٹا، ٹھنڈا اور ڈھیلا ہو۔ ایستادگی کم ہو۔ بوڑھوں کی نامردی میں یہ دوا بہت کارآمد ہے۔ کثرتِ تباکو نوشی سے نامردی کے لئے بھی یہ دوا مفید ہے۔

لائیکوپوڈیم

5- عضو میں ایستھکی نہ ہو۔ جلع کے وقت عضو ڈھیلا ہو جائے۔ اترال ایستھکی کے فوراً بعد اور کبھی ایستھکی سے پہلے ہی ہو جائے اس کے بعد مریض ٹانگوں میں کمزوری محسوس کرے۔ اکثر سڑھ کی ہڈی میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہو۔ جو رات کے وقت بڑھ جاتا ہو۔

فاسفورک ایسٹ

6- مکمل نامردی جو کثرت جلع سے یا بار بار سوزاک ہو جانے سے ہو گئی ہو (تھو جا۔ میڈور۔ ختم)۔ خواہش جلع باطل نہ رہے۔ عضو سرد اور پھلپھلا ہو جائے۔ بوڑھے افراد کی نامردی جو جوانوں جیسی خواہش جلع رکھتے ہوں۔ مریض قبل از وقت بوڑھا ہو جائے۔

اگنس ٹاسٹس

7- کثرت مبسرت یا جلق کی وجہ سے نامردی۔ جلع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جلع کی کوشش پر ایستھکی ختم ہو جائے۔ صبح غنودگی کی حالت میں تو ایستھکی موجود ہو لیکن جاگ اٹھنے پر ختم ہو جائے۔

کیلیڈیم

8- نامردی، جلع کی خواہش زیادہ ہو۔ لیکن عملی طور پر نامرد ہو۔ عضو کمزور اور ایستھکی بہت دیر کے بعد ہو۔ جلع کے بعد کمزوری اور چڑچڑاہٹ آجائے۔ جلع کرنے پر خود احتمالی نہ رہے۔ اکثر منی یا مذی بہتی رہے۔

سیلفیم

9- کثرت جلع یا جلق کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔ مریض ٹھنڈے، چڑچڑا اور شرمیلا ہو۔ جسمانی طور پر کمزور ہو۔ چہرہ مرجھایا ہوا ہو۔ اور آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جائیں۔ مریض کے ذہن پر بروقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔

سٹنی سائیکیرا

10۔ نامردی جس میں ایستادگی کم اور تھوڑے وقت کے لئے ہو۔ بغل گیر ہوتے ہی ایستادگی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے۔ زیادہ عرصہ تک کنوارا رہنے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔

کو نیم

11۔ جماع کی خواہش جنون کی حد تک ہو۔ لیکن کثرتِ جماع، کثرتِ احتلام، جلق یا نمک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔ جماع کے خیالات بہت زیادہ ہوں اور جماع کی خواہش کار و کنا مشکل ہو جائے۔ تاہم نامردی ہو۔

فاسفورس

نامردی کی چند دیگر ادویات

1۔ کثرتِ جماع کی وجہ سے جماع کی خواہش ہی نہ رہے۔ لہذا نامردی ہو جائے۔

کرفائٹس

2۔ عضو کی شدید کمزوری، نامردی، بغیر ایستادگی کے احتلام ہو جائے، کمزوری کی وجہ سے کانپے۔ خصلیوں پر پسینہ آئے۔

جیلسمیم

3۔ مادہ منویہ کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔

چائنا

4۔ زیادہ ترس کے ساتھ نامردی بھی ہو۔

ماسکس

5۔ عضو کی شدید کمزوری اور مادہ منویہ کے پتلا ہو جانے سے نامردی۔

برینا کارب

6۔ چوٹ لگ جانے سے نامردی ہو جائے۔

آرینیکا۔ ہائپرکیم

7- ناروی، جماع نہ کر سکے۔ عضو ڈھیلا ہو۔ جماع کی بڑھی ہوئی خواہش ہو۔

لائیکوپوڈیم۔
کیلیڈیم۔
چیلسمیم۔ سیلفیم۔

کلکیریا کلاب
کیلیڈیم۔ سیلفیم۔
اکنس کاسٹس
ار جنٹم نائٹ

8- ناروی، جماع کی کوشش پر راستہ کی ختم ہو جائے۔

9- بوڑھوں میں جماع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن وہ نارو ہوں۔

لائیکوپوڈیم۔
سیلفیم۔
اکنس کاسٹس

بایو کیمک ادویات

1- ناروی

نیزم فاس۔
کلکیریا فاس۔
کالی فاس۔ نیزم میور

عضو مخصوص

- 1- عضو چھوٹا، ٹھنڈا، لٹکا ہوا اور پھلپلا
کیلیڈیم۔
آگس کاسٹس۔
سلفر۔ لائیکوپوڈیم۔
نیوفریٹم
کیلیڈیم
ماسکس
اکٹیشیا
سٹفی سائیکیریا
میوریکس۔
لیک کناٹم۔ چائتا
- 2- عضو سرد اور اس پر ٹھنڈا پسینہ آئے۔
- 3- عضو چھوٹا ہارے کی مانند سکڑا ہوا لیکن ایستادگی پر مکمل
- 4- عضو چھوٹا اور پیچھے کی طرف کھچا ہوا۔
- 5- عضو ڈھیلے اور مر چھایا ہوا۔
- 6- عضو محض چھوٹے، نلے یا دبائے پر ہی ایستادہ ہو جائے۔
- 7- عضو کا اگلا سرائن ہو جائے یا اس پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہو۔
- 8- نامردی میں یہ احساس کہ عضو موجود ہی نہیں۔
- 9- احساس کہ عضو سی سے بندھا ہوا ہے۔
- 10- اعضائے تناسلی قبل از وقت نشوونما پانے لگیں۔
قاسفورک ایسڈ
کوکین
پلمبم
پلائینا

بد اثرات

1- مادہ منویہ کے بکثرت ضائع ہو جانے سے جسمانی کمزوری۔
آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ کانوں میں گھنٹیاں بھیں۔
پیمٹ ہوا سے پھولا ہوا ہو۔ حاد اثرات کے لئے ترجیحی دوا
ہے۔

چائنا

2- مادہ منویہ ضائع ہو جانے کے مرمین اثرات۔ چکر۔ ذہنی
تھکن کمزوری۔ ٹانگوں میں بھاری پن۔ مریض
اپنی صحت کی خرابی کے متعلق فکر مند رہتا ہو۔ زندگی کے
معمولات سے غافل ہو جائے۔

قاسفورک ایسڈ

3- کثرتِ مباشرت، کثرتِ مشیت زنی کے برے اثرات۔
مریض نگین اور لہروا ہو جائے۔ یادداشت کمزور۔ ذہن پر
ہر وقت جنسی خیالات چھانے رہیں۔

سٹیفی سائیکیریا

4- جلق لگانے کے بد اثرات، سردی ہاضمے کی تکلیف ہو
جائے۔ کثرتِ مباشرت اور احتلام کے برے اثرات کو
بھی دور کرتی ہے۔ نوجوانوں میں مشیت زنی کے برے
اثرات ختم کرنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔

نکس وایکا

5- احتلام، کثرتِ جماع یا مشیت زنی کی وجہ سے اعصابی کمزوری
ہو جائے بعض اوقات دل کی غیر معمولی دھڑکن ہو۔

ایوناشائیوا

6- مشیت زنی سے مرگی ہو جائے۔ مرگی سے ہوش و حواس قائم
رہیں۔

قاسفورس

- 7- مادہ منویہ ضائع ہونے کے بد اثرات۔ مریض قبل از وقت
بوڑھا ہو جائے۔
اکسن کاسٹس
- 8- کثرتِ مباشرت سے فلج ہو جائے۔
نیٹرم میور
- 9- مشت زنی، کثرتِ جماع کی وجہ سے مرگی کا دورہ پڑنے
لگے۔ جماع کے دوران ہی مرگی کا دورہ پڑ جائے۔
یوفو
- 10- مشت زنی، کثرتِ جماع کے بد اثرات جبکہ تمام جسم ڈھیلا
ڈھالا ہو گیا ہو۔ معمولی حادثہ یا واقعہ سے ہاتھ پاؤں کانپنے
لگیں۔
جیلسمیم
- 11- کثرتِ مباشرت سے رڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو
جائے۔
اگریکس
- 12- کثرتِ جماع اور مشت زنی کے بد اثرات کی دیگر اہم
ادویات۔
پیکرک ایسڈ۔
انا کارڈیم

خواہشِ جماع دب جانے کے بد اثرات

- 1- جماع کی خواہش دب جانے سے تکلیف ہو جائے۔
کونیم۔ پلسبائیلا۔
ایپس۔ کیمفر
- 2- خواہشِ جماع دب جانے یا زندگی بھر کنوارا رہنے کے
بد اثرات اگر چکر بھی موجود ہوں تو یقینی دوا ہے۔
کونیم

بایو کیمک ادویات

1- جماع کے بعد جسمانی اور دماغی کمزوری۔ مینائی مہم جو

جانے۔

2- جماع کے بعد کمزوری

کالی فاس
سلیشیا

ذہنی علامات

1- مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جائے۔ یادداشت ختم ہو جائے۔ جماع کے بعد سوچ بچار مشکل ہو جائے۔ خیالات کا سلسلہ قائم نہ رکھ سکے۔ اغلام بازی کی عادت چھڑانے کے لئے مفید دوا ہے۔

فاسفورک ایسڈ

2- مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو ذہن ہر وقت جنسی خیالات میں پھنسا رہے۔ اپنی تکالیف بیان کرنے کے لئے تنہائی کا خواہشمند ہو۔ مریض چڑچڑا شر میلا اور نگین ہو۔

سٹنٹی سائیکیریا۔

3- جنسی خیالات کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہے۔ بھول چوک اکثر ہو جاتی ہو۔ ایک کام کر لینے کے باوجود مریض کو یقین نہیں آتا کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں۔ خیالات میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ مریض لیٹ جانے کی بے حد خواہش رکھتا ہے۔

کیلیڈیم

4- مرد ہو یا عورت جماع کا جذبہ سز پر سوار رہتا ہو۔ کثرت مباشرت اور جلق سے مریض بزدل اور قوت فیصلہ سے عاری ہو جائے۔ بعض اوقات دیوانہ ہو جائے۔

فاسفورس

- 5۔ جملع کی خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے نکلین رہنے لگے
اور اسی وجہ سے عورتیں، بشریہ میں مبتلا ہو جاتیں۔
کو نیم
- 6۔ مریض کو خدشہ ہو کہ شادی کے بعد وہ ناکام ثابت ہو گا۔
بے حد نکلین ہو۔ زودرنج ہو اور بات بات پر بگڑ جائے۔
مریض خیال کرے کہ کچھ وقت کے بعد موت آجائے گی
اس لئے کوئی کام کرنا فضول ہے۔
انکس کانسٹس

حصہ دوم (زنانہ)

جماع

1- شرمگاہ کی خشکی جماع میں رکاوٹ پیدا کرے۔
نیشترم میور۔
لائیکوپوڈیم۔
لائئ سین

2- شرمگاہ نہایت حساس ہو جس کی وجہ سے جماع نہ کیا جا سکے۔

پلائینٹا۔ تموجا
کاسٹیک۔ سپینا۔

3- جماع میں لطف ہی نہ آئے۔

بررس ولگرس

بروسیم

کونیم۔

4- جماع کی خواہش دب جانے کے برے اثرات۔

سیسل سیرولینا

نفرت

1- جماع سے نفرت ہو۔ عورت شادی کا خیال تک برداشت نہ کر سکے۔

پلسائیل

ہائپر اسٹنس
کریازوٹ

2- جماع کا خیال ناقابل برداشت ہو۔

3- جماع کے خیال ہی سے بے چین اور خوفزدہ ہو جائے۔

شہید خواہش

- 1- کنواری لڑکی میں۔
 - 2- یہ وہ عورت میں
 - 3- بوزھی عورت میں
 - 4- حمل کے دوران
 - 5- حیض آنے سے پہلے
 - 6- حیض کے دوران
 - 7- بچے کی پیدائش کے بعد عورت جب بستر پر ہو
 - 8- جماع کی خواہش بڑھ جانے کی چند دوسری ادویات۔
- پلامینا۔ کالی فاس
اوریٹا نم۔ ایپس
ماسکس
یلاڈونا
یلاڈونا
پاسا میلا
یلاڈونا
نکس وایکا۔
کلکیریا کارب۔
کالی فاس۔ لیکینس۔
گریشی اولا
بانیوسا ٹیمس۔
کیٹنٹھرس۔
سٹرامونیم۔
وریٹرم البم

خواہش کی زیادتی

- 1- جماع کی خواہش نہایت ہی شدید ہو۔ جنونِ شہوت ہے۔
پلاٹینا۔ اور گانم
میوریکس۔
کلکیریا کلاب
- 2- جسم کے کسی حصے کو بھی اگر چھوا جائے تو جنسی خواہش
بھڑک اٹھے۔
میوریکس
اور گانم۔
- 3- جماع کی شدید خواہش جو اُسے جلق کی طرف مائل کر دے۔
زنگم میٹ۔
میوریکس
- 4- جماع کی شدید خواہش کی وجہ سے بانجھ پن ہو جائے۔
اور گانم۔ پلاٹینا۔
قاسفورس
- 5- جماع کی شدید خواہش جسے دبانے کے لئے اپنے آپ کو
مصروف رکھے۔
للیم جگ

خواہش کی کمی (دیکھئے منفرت بھی)

- 1- جماع کی رغبت ہی نہ رہے۔
سپینا۔ نیرم میور۔
کاسٹیکم
- 2- جماع کی خواہش کم ہو جائے۔
اگنیشیا۔ انا سموڈیم۔
اگنس ہاسٹس۔
بیلوناس

جملع کے دوران

1- شرمکھ میں درد ہو

پیپلا نیٹرم سیو۔
در چشم ہائٹ
شقی سائیکیرا۔
میرس و لکرس۔
فلی سین

2- شرمکھ میں درد محسوس کرے۔ درد جملع کے بعد بھی
رہے۔

3- جملع برداشت نہ کر سکے یا جملع کے دوران غش کھا جائے۔
4- شدید درد ہو جملع کے دوران شرمکھ سے ہوا خالیج ہو

کریازوٹ
پلائینا۔ اور کانم۔
میوریکس
لائیکوپوڈیم

جملع کے بعد

1- تکالیف بڑھ جائیں۔

اگریکس۔ سیلیا
کلیریا کلب۔
کلی کلب سیپا۔

2- تھی شادی شدہ عورتوں کو پیشاب کرنے کے لئے زور
لگانا پڑے۔

3- شرمکھ میں درد ہونے لگے۔

شقی سائیکیرا
کریازوٹ

لائیکوپوڈیم - لائی سین
ارجنٹیم نامٹ -
کریازوٹ -
ناوٹرک ایسٹ
سپیا - نیٹرم کلرپ

4- شرمگاہ میں جلن ہونے لگے۔
5- شرمگاہ سے بکثرت خون بہنے لگے۔

6- لیکوریا شروع ہو جانے

بایو کیمک ادویات

کلکیریا فاس -
کلکیریا فلور - سلیشیا
کلکیریا فاس
کالی فاس
کلکیریا فاس
فیرم فاس -
کالی سلف
فیرم فاس
سلیشیا
فیرم فاس -
نیٹرم میور
کلکیریا فاس

1- خواہش جماع زیادہ ہو جائے۔

2- حیض آنے سے پہلے جنسی خواہش بڑھ جائے۔

3- حیض کے بعد جنسی خواہش کاغلبہ ہو جائے۔

4- جنسی خیالات کاغلبہ رہے۔

5- جماع سے نفرت ہو جائے۔

6- شرمگاہ گرم، خشک، جماع کے بعد درد محسوس ہو۔

7- جماع کے دوران اور اس کے بعد متلی ہو جائے۔

8- جماع کے دوران شرمگاہ میں درد ہو۔

9- جماع کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔

جَلَق (انگشت زنی)

- 1- لٹکی میں انگشت زنی کی شدید خواہش -
اور بکائیم - پلائینا -
گریٹی اولا
- 2- جماع کی شدید خواہش یا شرمگاہ میں خارش جو اسے انگشت
زنی کی طرف مائل کر دے -
اور بکائیم - کیلیڈیم -
ڈنکم سیٹ - میوریکس
پلسائینا
- 3- جلق لگانے کی وجہ سے لیکوریا ہو جائے -
- 4- عورت جو جلق لگانے کی مرتکب رہی ہو - وہ شادی کے
بعد جماع میں بالکل لطف محسوس نہ کرے -
انگس کاسٹس
اور بکائیم - پلائینا -
گریڈوٹ
- 5- شرمگاہ میں شہوانی خارش -

متفرق

- 1- جلد ہی حمل ٹھہر جائے -
نیرم میور - مرک سل
- 2- اعضائے تناسل قبل از وقت نشوونما پانے لگیں -
پلائینا

ادویات کے تعلقات

اس کتاب میں تقریباً 90 ہومیوپیتھک ادویات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کتاب کو مفید تر بنانے کے لئے صرف ان ادویات کے آپس میں تعلقات درج کر دیئے گئے ہیں۔ جن کی مدد کاں دافع اثر یا مخالف دوائیں بھی ان 90 ادویات میں ہی موجود ہیں۔ وہ ادویات جن کی دافع اثر ادویات تو ہیں لیکن مددکاری یا مخالف ادویات نہیں ہیں انہیں اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ کیوں کہ ترکیبی دافع اثر دوائیں ان ادویات کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے جس کے لئے کسی بھی تفصیلی فہرست سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

ادویات	مددکار دوائیں	دافع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
ارجنٹم ٹائٹ	کالی کارب۔ لائیکوپوڈیم۔ سلفر۔ سلیشیا۔ فاسفورس	کیمیفر	
آرنیکا	کلکیریا کارب۔ وریمریم اہم	کیمیفر۔ نیشرم میور	
آکسس کاسٹس	کیلیڈیم۔ سیلنیم	کیمیفر۔ آرنیکا	
آکیشیا	نیشرم میور۔ سپیا۔ فاسفورک ایسٹ		
اناکارڈیم	لائیکوپوڈیم۔ پلساٹیلہ۔ پلائینا		
آئیوڈیم	لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا	گریشی اولہ۔ لہس۔ تھوجا	فاسفورس
لہس	سلفر۔ برشا کلاب۔ پلساٹیلہ۔ آرنیکا	کینتھرس۔ لیکیس۔ ایڈم پال	فاسفورس
	نیشرم میور		
برزس ولگرس	لائیکوپوڈیم	سلاڈونا۔ کیمیفر	
برشا کلاب	سلیشیا	کیمیفر۔ سلاڈونا۔ مرک سال زنگم میٹ	کلکیریا کلاب
بروسیم	ارجنٹم ٹائٹ۔ کالی کلاب	کیمیفر۔ امونیا کلاب۔ اوہیم	
سلاڈونا	کلکیریا کلاب۔ مرک سال۔ نیشرم میور	پلساٹیلہ۔ کیمیفر۔ اوہیم۔ ہائیوسائیمس	
سیوفو	کلکیریا کلاب	لیکیس اوہیم	

ادویات	مددگار ادویات	دفع اثر و ادویات	مخالف ادویات
پٹرولیم	سپیا	نکس و امیکا۔ فاسفورس	
پلائینا	سپیا۔ اناکاروڈیم	یلاڈونا۔ پلساٹیل	
پلساٹیل	لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا۔ کللی بان۔	نکس و امیکا۔ اکتیشیا	
تھوجا	سپیا۔ زنگم میٹ	سٹفی سائیکیرا	
بیلیم	سلیشیا۔ مرک سال۔ نیرم میور۔		
	ناٹرک ایسڈ		
بیلیم	سپیا۔ ار جنتم ناٹ۔ کلکیر فاس۔	نیرم میور۔ جمی نیلس۔ نکس و امیکا	
	کللی کارب	پلساٹیل۔ سلفر۔ وزیرم البم	
چاتا	کلکیر فاس۔ کللی کارب	لیکس۔ نیرم میور۔ نکس و امیکا۔	
		سپیا۔ پلساٹیل۔ سلفر۔ وزیرم البم	
ڈبی نیلس	یلاڈونا۔ نکس و امیکا۔ سلفر	کیمفر۔ لپس۔ کلکیر کارب۔ اوڈیم	
		ناٹرک ایسڈ	
زنگم میٹ	پلساٹیل۔ سپیا۔ سلفر۔ کلکیر فاس	کیمفر۔ اکتیشیا۔	نکس و امیکا
سٹفی سائیکیرا	کاسٹیکم	کیمفر	
سپیا	نیرم میور۔ فاسفورس۔ نکس و امیکا	—	لیکس۔ پلساٹیل
	ناٹرک ایسڈ۔ نیرم کارب۔ نیرم فاس		
سینیم	—	اکتیشیا۔ پلساٹیل	چاتا
سلفر	کلکیر کارب۔ یلاڈونا	کیمفر۔ چاتا۔ تھوجا	
فاسفورک ایسڈ	چاتا	کیمفر۔ سلفر۔ سٹفی سائیکیرا	
فاسفورس	لائیکوپوڈیم۔ کللی کارب۔ سلفر	کیمفر۔ نکس و امیکا	کاسٹیکم لپس
فلورک ایسڈ	چاتا	کیمفر۔ سلفر۔ سٹفی سائیکیرا	
کاسٹیکم	کریفائٹس۔ سلفر۔ سٹفی سائیکیرا	نکس و امیکا	
	لیکس		

ادویات	مددگار دوائیں	دفع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
کریازوٹ	فاسفورس۔ سلفر	نکس و لمبیکا	
کلکیریا کلاب	سلاڈونا۔ لائیکوپوڈیم۔ برشا کلاب	کیفر۔ نائٹرک ایسڈ۔ نکس و لمبیکا	سلفر
کونیم	فاسفورس	چائٹا۔ سیپا	
کیسکیم	نیزم میور	نائٹرک ایسڈ	
کیلینڈیم	نائٹرک ایسڈ	کیفر۔ کیلینڈیم	زنگم میٹ
کینتھرس	لمپس	کیسکیم۔ اگنیشیا۔ ہائیوسائیمس	
گرفائٹس	ارجنٹم نائٹ۔ کاسٹیکم۔ لائیکوپوڈیم	پلسائیل	
لائیکوپوڈیم	سلفر۔ لیکیس۔ کللی کلاب۔	نکس و لمبیکا۔ چائٹا	
	آئیوڈیم۔ اگنیشیا۔ کلکیریا کلاب۔	کیفر۔ چائٹا۔ کاسٹیکم	
لیکیس	فاسفورس		
	لائیکوپوڈیم۔ نائٹرک ایسڈ۔	مرک سال	سیپا
	فاسفورس۔ زنگم۔ آئیوڈیم۔		امونیا کلاب
	کلکیریا کلاب		
مرک سال	سلاڈونا۔ سیپا۔ سلفر۔ نائٹرک ایسڈ	سٹفی سائیکیریا	لیکیس
نائٹرک ایسڈ	کیلینڈیم۔ سیپا۔ لائیکوپوڈیم	کونیم۔ مرک سال۔ پرولیم۔ سلفر	لیکیس
نکس و لمبیکا	سیپا۔ کونیم۔ کللی کلاب۔	کیفر۔ اگنیشیا۔ تموجا۔ سلاڈونا	زنگم میٹ۔
	فاسفورس۔ پلسائیل۔ سلفر		کاسٹیکم اگنیشیا
نیزم میور	لمپس۔ کیسکیم۔ ارجنٹم نائٹ	کیفر۔ فاسفورس۔ نکس و لمبیکا۔	
ورنیم البم	آرنیکا	کیفر۔ چائٹا	

